



نام خانوادگی :		نام :	پزشک معالج:
تاریخ پذیرش :	تاریخ :	جنسیت :	سن :

نوع عمل جراحی :



راهنمای ویدئویی



آدرس مرکز

• اقدامات قبل از انجام نمونه برداری :

لازم به ذکر میباشد ساعت تعیین شده حضور در مرکز تقریبی می باشد و ممکن است

برای انجام امور بیمارانی که نیاز به اقدامات خاص دارند و یا بیماران اورژانسی انجام نمونه برداری از شما با تاخیر (۴ الی ۵ ساعت) انجام گردد. لطفاً برای انجام نمونه برداری صبور باشید.

بیمار گرامی با توجه به اینکه اقدامات نمونه برداری به نوعی عمل جراحی می باشد لذا رعایت موارد ذیل الزامی می باشند:

- * در روز انجام نمونه برداری هر بیمار باید یک همراه ترجیحاً مرد داشته باشد.
- * بیمار ۸ ساعت قبل از موعد وقت تعیین شده جهت نمونه برداری ناشتا باشد.
- * قبل از مراجعه استحمام نموده و بیماران آقا موهای زائد محل عمل را با دقت بتراشند. لاک ناخنها حتما پاک شود و بیمارانی که کاشت ناخن دارند حتما یکی از ناخن ها Remove شود.
- * لطفا در صورتیکه قبلاً سابقه خونریزی داشته‌اید حتما به پزشکان اطلاع دهید.
- * لطفا در صورت داشتن سابقه قلبی، نارسایی کلیوی یا کبدی به پزشکان اطلاع دهید.
- * در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خون (آسپرین، وارفارین، هپارین، دیپیریدامول، پلاویکس (کلوپیدوگrel)، اسویکس، پراسوگرل، تیکلوپیدین، سیلوستازول، پنتوکسی فیلین، تیکاگرلور، فونداپارینوکس، ادوکسابان، ریواروکسابان، دابیگاتران، امگا ۳، مسکن ها به جز استامینوفن و ...) حتما قسمت پذیرش و وقت دهی را مطلع سازید.
- * بیمارانی که قرص های رقیق کننده خون مصرف می کنند با صلاحدید پزشک مربوطه، بایستی حداقل ۷۲ ساعت قبل از انجام آزمایش خون قرص های رقیق کننده خود را قطع کنند و سپس آزمایش خون انجام دهند و همچنین تا زمان انجام نمونه برداری قرص های ضد انعقاد خون مصرف نشود.
- * در صورتی که بیمار مشکل قلبی اعم از (آنژیو قلب، عمل قلب باز، استندگذاری و...) انجام داده بودند و تحت نظر دکتر قلب نیز هستند حتما باید تاییدیه قلب از دکتر متخصص قلب بگیرند که انجام نمونه برداری و قطع کردن قرص های ضد انعقاد خون به مدت ۳ الی ۵ روز بلامانع می باشد.
- * در روز انجام نمونه برداری بیماران مبتلا به آسم دارو و اسپری های مصرفی خود را به همراه داشته باشند.
- * جواب آزمایشات خون درخواست شده (CBC, PT, PTT, INR, FBS, BUN, CR) حداکثر تا یک ماه اعتبار دارند.
- * مدارک بیمار اعم از کارت ملی بیمار، نسخه پزشک و مدارک قبلی شامل MRI، CT-SCAN، سونوگرافی، پت اسکن، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، شرح عمل، آزمایشات، پاتولوژی را در روز انجام نمونه برداری به همراه بیاورید و به پزشکان تحویل دهید.
- * تمامی بیماران بالای ۴۰ سال باید نوار قلب همراه خودشان داشته باشند.

- * انجام مشاوره بیهوشی قبل عمل در مرکز تصویربرداری تهران انجام می گردد.
- * بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون جهت دستورالعمل مصرف انسولین و داروهای ضد فشارخون قبل و بعد از نمونه برداری با پزشک خود مشورت کنند.
- * لیست داروهایی که مصرف می کنند را داخل برگه یادداشت کنند و همراه خود بیاورند.
- * فقط در پروسیجرهای استوئید استئوما و ماکرو ویو ریه، ماکروکبد، ورتبروپلاستی هزینه تهیه سوزن به عهده بیمار می باشد.

• اقدامات پس از انجام نمونه برداری :

- * بعد از ترخیص در صورت داشتن هر کدام از علائم تنگی نفس شدید، تب، تعریق و بیحالی، افت فشار خون، خلط خونی، دل درد شدید، درد موضعی غیرقابل تحمل، احتباس ادرار که فعالیت بیمار را مختل نموده، خون روشن در ادرار و یا مدفوع و سایر علائمی که بعد از انجام نمونه برداری ایجاد شده اند، سریعاً به اورژانس بیمارستان محل سکونت خود مراجعه نمائید و با مرکز تماس بگیرید.
- * پس از انجام نمونه برداری ضروری است بیمار به مدت ۱۲-۲۴ ساعت در تخت استراحت نموده و از انجام هرگونه حرکات سنگین و بلندکردن اجسام اکیدا خودداری نماید و عوارض بعد از انجام نمونه برداری تا ۷۲ ساعت عادی می باشد.
- * در صورت داشتن درد مختصر فقط مصرف استامینوفن و استامینوفن کدئین بلامانع است. (از مصرف سایر مسکن ها خودداری نمایید) پانسمان محل نمونه برداری ۲۴ ساعت بعد برداشته و بیمار استحمام نماید.

بیماران گرامی لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

- * از آنجایی که نمونه برداری به صورت سوزنی می باشد، علی رغم استفاده پزشکان این مرکز از مدرنترین روش موجود بیوپسی در دنیا ممکن است نمونه ناکافی و یا جواب مبهم باشد که نیاز به تکرار نمونه برداری می باشد.
- * هزینه آزمایشگاه و پاتولوژی جدا از هزینه های پرداختی در مرکز می باشد.
- * مبلغ بیعانه واریزی بابت رزرو وقت در صورت کنسلی عودت داده نمیشود.

دستور العمل و آمادگی بیماران بیوپسی پروستات:

- ۱- در بیوپسی پروستات (نظافت ناحیه تناسلی و اطراف مقعد (شیو ناحیه ژنیتال و پرینه)
- ۲- در بیوپسی پروستات شب قبل از نمونه برداری شام سبک مثل سوپ میل شود.
- ۳- در بیوپسی پروستات قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت از ۱ روز قبل مصرف کنید (تعداد ۱۰ عدد)
- ۴- در بیوپسی پروستات قرص مترونیدازول ۲۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت از ۱ روز قبل مصرف کنید. (تعداد ۲۰ عدد)
- ۵- در بیوپسی پروستات آمپول سفتازیدیم ۱ گرم (عضلانی) یا سفتراکسیون را تهیه کنید و همراه خود بیاورید
- ۶- در بیوپسی پروستات ژل Xylocaine استریل ۱ عدد را تهیه کنید و به همراه خود بیاورید
- ۷- در بیوپسی پروستات یک عدد شیاف بیزاکودیل در روز انجام کار ۳ ساعت قبل از زمان حضورتان در مرکز استفاده شود.
- ۸- در بیوپسی پروستات بیمارانی که MRI در این مرکز انجام نداده اند حتماً CD آخرین MRI را همراه خود بیاورند.